

Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

Angised citrom szopogató tablettá

klórhexidin-dihidroklorid és lidokain-hidroklorid

Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3-4 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Angised citrom szopogató tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Angised citrom szopogató tablettá alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Angised citrom szopogató tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Angised citrom szopogató tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Angised citrom szopogató tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Angised citrom szopogató tablettá klórhexidin-dihidrokloridot tartalmaz, amely fertőtlenítő hatású, valamint lidokain-hidrokloridot, amely a helyi érzéstelenítők csoportjába tartozik, és érzéstelenítő hatása csökkenti a fájdalmat.

Az Angised citrom szopogató tablettá alkalmas a garat és a szájüreg rövid ideig tartó helyi, tüneti kezelésére, felnőttek és 6 évesnél idősebb gyermekek számára a következő betegségek esetén:

- Torokfájás, torokgyulladás, irritációval kísért garat- és szájüregi betegségek, pl. fogínygyulladás, szájnyálkahártya-gyulladás és afta tüneteinek kezelése.

2. Tudnivalók az Angised citrom szopogató tablettá alkalmazása előtt

Ne alkalmazza az Angised citrom szopogató tablettát:

- ha allergiás a klórhexidin-dihidrokloridra vagy a lidokain-hidrokloridra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- 6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Angised citrom szopogató tablettá alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

- Az Angised citrom szopogató tablettát nem szabad hosszú ideig, folyamatosan, illetve ismételt alkalommal alkalmazni. Kizárólag csak a meglévő fájdalom és irritáció enyhítésére alkalmazza!
- Túlzottan magas adagban alkalmazva (több mint 20 tablettá naponta) előfordulhat a nyelési reflex csökkenése, és az étel a légutakba kerülve fulladást okozhat.

- Ha egyéb gyógyszereket is szed, kérjük, olvassa el az „Egyéb gyógyszerek és az Angised citrom szopogató tabletta” című bekezdést.
- Orvoshoz kell fordulni, ha a fertőzésnek a torokfájáson kívül egyéb tünetei (pl. láz, fejfájás, émelygés, hányás) is vannak.

Ha a fenti figyelmeztetések valamelyike vonatkozik vagy vonatkozott Önre a múltban, keresse fel kezelőorvosát.

Gyermekek és serdülők

6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében ne alkalmazza ezt a gyógyszert!

Egyéb gyógyszerek és az Angised citrom szopogató tabletta

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről.

- Más fertőtlenítő hatású szerrel együtt ne alkalmazza!

Az Angised citrom szopogató tabletta egyidejű alkalmazása étellel és itallal

A tablettát közvetlenül evés, ivás után szopogassa el.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A fent említett óvintézkedések betartása mellett az Angised citrom szopogató tabletta a terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható.

Tájékoztassa kezelőorvosát arról, hogy ezt a gyógyszert szedi.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nincs szükség különösebb elővigyázatosságra.

Az Angised citrom szopogató tabletta szorbitot és aszpartámot tartalmaz

Az Angised citrom szopogató tabletta szorbitot tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert. A szorbit enyhe hasmenést okozhat. A szorbit kalóriaértéke 2,6 kcal/g.

Az Angised citrom szopogató tabletta aszpartámot, azaz fenilalanin forrást tartalmaz, ami fenilketonuriában (a vér emelkedett fenilalanin szintjével járó anyagcserezavar) szenvedő betegek esetében ártalmas lehet.

Az Angised citrom szopogató tabletta cukormentes, így cukorbeteg is alkalmazhatják.

3. Hogyan kell alkalmazni az Angised citrom szopogató tablettát?

A gyógyszert mindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ezt a gyógyszert nem szabad hosszú ideig szedni. Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 3-4 napon belül rosszabbodnak vagy nem javulnak.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőttek : 6-10 tabletta naponta.

Hagyja, hogy a tabletta lassan elolvadjon a szájában.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

Gyermekek (6 éves kor felett): 3-5 tabletta naponta.

Hagyja, hogy a tabletta lassan elolvadjon a szájában.

Ha az előírtnál több Angised citrom szopogató tablettát alkalmazott

A mérgező adag sokszorosa az ajánlott adagnak. Megfelelően alkalmazva a túladagolás veszélye nagyon csekély.

Ha a következő tüneteket észleli azonnal forduljon orvoshoz:

A túladagolás tünetei (a lidokain összetevő miatt): nyugtalanság, ásítózás, idegesség, akaratlan szemmozgások, izomrángás, görcsök, fülzúgás, nehézlégzés, szívritmuszavar, lassú szívverés, szívmegállás, alacsony vérnyomás, értágulat a végtagokon, csökkent nyelési reflex.

Félrenyelés esetén:

- Tisztítsa meg a légutakat, alkalmazza a Heimlich-féle műfogást.
- Amennyiben az elzáródást nem sikerül megszüntetni, azonnal orvosi segítséget kell hívni.

Ha elfelejtette alkalmazni az Angised citrom szopogató tablettát

Nincs szükség különösebb elővigyázatosságra.

Ha idő előtt abbahagyja az Angised citrom szopogató tabletták alkalmazását

Nincs szükség különösebb elővigyázatosságra.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

- Ritka mellékhatások (1000-ból legfeljebb 1 beteget érinthet): a bőrön és a nyálkahártyán előforduló allergiás reakció
- Nagyon ritka mellékhatások (10 000-ból legfeljebb 1 beteget érinthet) az ízérzékelés zavara, a nyelv irritációja és súlyos allergiás reakciók (anafilaxiás reakciók) is előfordulhatnak.
- Hosszan tartó és folyamatos alkalmazása a fogak barnás elszíneződését okozhatja, ami azonban könnyen eltávolítható.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Angised citrom szopogató tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon/a buborékcsomagoláson feltüntetett lejárati idő ("Felh.:") után ne alkalmazza az Angised citrom szopogató tablettát. Az első két számjegy a hónapot jelöli, az azt követő kettő vagy négy pedig az évet. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Angised citrom szopogató tablettá?

- A készítmény hatóanyagai: 5 mg klórhexidin-dihidroklorid és 1 mg lidokain-hidroklorid
Egyéb összetevők: szorbit, magnézium-sztearát, aszpartám, citrom aroma 501050 AP0551 (amely aromákat, maltodextrint és α -tokoferolt tartalmaz) aceszulfám-kálium.

Milyen az Angised citrom szopogató tablettá külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Küllem: Fehér vagy csaknem fehér, enyhén pettyezett, kerek, citrom ízű préselt szopogató tablettá.

Átmérője: 16 mm, vastagsága: 5,1 mm.

Csomagolás: 12, 24 vagy 36 db préselt szopogató tablettá perforált buborékcsoomagolásban és dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.
Magyarország

Gyártó

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9, 2880 Bornem
Belgium

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Szlovénia

OGYI-T-22994/04	12x	PVC/PCTFE//Al buborékcsoomagolásban
OGYI-T-22994/05	24x	PVC/PCTFE//Al buborékcsoomagolásban
OGYI-T-22994/06	36x	PVC/PCTFE//Al buborékcsoomagolásban

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2018. június